

11ª Mostra Científica

Pesquisa, Pós Graduação e Extensão

UN
UNESC

LINFOMA DE HODGKIN NO ESPÍRITO SANTO: UMA ANÁLISE EPIDEMIOLÓGICA

Júlio César Bridi¹, Stéfane Pereira Sanglard¹, Lia Drago Riguetto Broseghini²

¹ Graduando em Medicina – UNESC; ² Doutoranda em Ciências da Saúde, Professora do curso de Medicina no Centro Universitário do Espírito Santo – UNESC
juliocesarbridi@gmail.com / liadriguetto@gmail.com

INTRODUÇÃO

O linfoma de Hodgkin (LH) é uma neoplasia originária de células B, que acomete principalmente os gânglios linfáticos cervicais, mediastinais e torácicos. A doença acomete principalmente adolescentes e adultos jovens, do sexo masculino, mas que pode incidir sobre qualquer faixa etária e sexo. Os principais sintomas associados ao LH são linfadenopatia, prurido generalizado, febre, sudorese noturna e perda de peso. Quando diagnosticado e tratado adequadamente o LH apresenta um bom prognóstico.

OBJETIVO

Descrever o perfil epidemiológico das internações por LH no estado do Espírito Santo.


METODOLOGIA

Trata-se de um estudo ecológico, quantitativo, descritivo a partir da coleta de dados disponíveis no DATASUS – Morbidade Hospitalar do SUS, no qual analisou-se o número de internações LH, estratificando os dados por sexo, etnia, faixa etária, tempo médio de internação, custo total e mortalidade entre janeiro de 2013 e dezembro de 2022.


RESULTADOS

Durante o período explorado, ocorreram 1.161 internações por LH, com o predomínio destas no sexo masculino 58,3% (677). Em relação a raça, há um predomínio nos indivíduos de cor branca e parda, totalizando 85,3% e dos pacientes 56,6% tinham idade entre 20 e 39 anos. O tempo de internação média foi de 5,1 dias na população geral, sendo 92,2% (9,8 dias) maior na faixa etária de 10 a 14 anos. O custo médio por internação foi de 1.959,08 reais no geral, acumulando em 10 anos o total de R\$ 2.274.492,01. A taxa de mortalidade na população geral foi de 3,1 e esse índice foi de 10,57 na população com 60 anos ou mais.


Internações por LH de acordo com sexo.



Internações por LH de acordo com a faixa etária.



Média de dias de permanência hospitalar por faixa etária.



CONSIDERAÇÕES FINAIS

As internações por LH mostraram-se mais prevalentes em homens pardos e brancos, com idade entre 20 e 39 anos, com alto custo de hospitalização. As maiores taxas de mortalidade concentraram-se em indivíduos com idade superior a 60 anos. Portanto, faz-se necessário a intensificação do diagnóstico precoce, com objetivo de melhorar o prognóstico em pacientes com idade mais avançada.

REFERÊNCIAS

- CONNORS, Joseph M. et al. Author Correction: hodgkin lymphoma. **Nature Reviews Disease Primers**, [S.L.], v. 7, n. 1, 20 out. 2021. Springer Science and Business Media LLC. <http://dx.doi.org/10.1038/s41572-021-00319-5>.
- BRASIL, **Ministério da Saúde. Sistema de informações Epidemiológicas e Morbidade.** Disponível em: <<http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php>>. Acesso em: 10 de set. 2023.
- LaCasce, Ann N. et al. Clinical presentation and diagnosis of classic Hodgkin lymphoma in adults. **UpToDate**. Ago. 2023. Disponível em: <<https://acesse.dev/y7mNv>>. Acesso em: 10 de set. 2023.